



才储团队[®]人才评估与选拔研讨小组

MMPI(明尼苏达多项人格问卷)模型测验报告

原著：[美]明尼苏达大学 / 编译：才储团队

测试者: sdk

完成问卷时间: 2011-12-12

目录

原始得分及标准分	1
量表得分及简明阐释表	3
被测者临床量表人格特征分析	3
MMPI医师手册	3
后记	5

1、报告可信度量表及校正量表得分：

L(说谎或掩饰)原始分：0

F(诈病)原始分：44

警告：F量表结果呈强偏离（诈病）态势，结果不可信！

K(校正)原始分：1

2、临床量表原始得分：

Hs (hypochondriasis , 疑病) 量表原始分：11

D (depression , 抑郁) 量表原始分：20

Hy (hysteria , 癔症) 量表原始分：13

Pd (psychopathicdeviate , 精神病态) 量表原始分：24

Mf-m (masculinity-femininity , 男子女性化) 量表原始分：28

Pa (paranoia , 偏执) 量表原始分：25

Pt (psychasthenia , 精神衰弱) 量表原始分：39

Sc (schizophrenia , 精神分裂) 量表原始分：59

Ma (hypomania , 轻躁症) 量表原始分：35

Si (socialintroversion , 社会内向) 量表原始分：34

3、需加K(校正)分临床量表的原始得分及标准分：

Hs (疑病) 量表+0.5K=11 转化成标准分为：40

Pd (精神病态) 量表+0.4K=24 转化成标准分为：50

Pt (精神衰弱) 量表+1.0K=40 转化成标准分为：65

Sc (精神分裂症) 量表+1.0K=60 转化成标准分为：78.75

Ma (轻躁狂) 量表+0.2K=35 转化成标准分为：78

4、无需加K(校正)分临床量表原始得分及标准分：

Mf-f量表(女子男性化)原始分为：25 转化成标准分为：67.5

D (抑郁) 量表原始分为：20 转化成标准分为：38

Hy (癔症) 量表原始分为：13 转化成标准分为：37

Pa (偏执) 量表原始分为：25 转化成标准分为：80

Si (社会内向) 量表原始分为：34 转化成标准分为：46

5、说明：标准分计算公式为： $T=50+10(X-Y)/SD$ X表示被试者在某量表上所得的原始分数，Y表示被试所在样本组原始分数的平均数，SD表示样本组原始分数的标准差

说明：T分在40-60分是正常范围；在30分以下或70分以上则是显著异常；在30-40分和60-70分之间是轻度异常。此测量结果需要心理咨询师专门解析。

编号	因子名称	修正原始分	标准分(T分)	简要说明
1	Q不能回答的问题	不适用	不适用	没有回答的题数和对“是”和“否”都做反应的题数。399题中超过22分，566题超过30分，结果不可信。
2	L说谎分数	0	不适用	追求尽善尽美，细小短处也不承认。原始分超过10分，结果不可信。
3	F诈病量表	44	不适用	古怪荒唐，说明伪装疾病或精神病程度重。
4	K校正分量表	1	不适用	一是判断被试对测验的态度是否隐瞒或防卫；二是修正临床量表的得分。
5	Hs疑病量表	11	40	此量表原来是为了鉴定疑病患者而制定的。其特征是对自己的身体健康的一种过度的关心，担心自己有病或不健康。
6	D抑郁量表	20	38	此量表最初是为评价抑郁症候而制定的。抑郁的特征是缺乏干劲，对未来没有希望，一般对自己的生活状况极其不满。
7	Hy癡病量表	13	37	此量表原来是为了区别对紧张状况产生歇斯底里反应的患者而制定的。癡病的特征是心因性的不随意肌体机能丧失和机能障碍。
8	Pd精神病态量表	24	50	此量表原来是为了区别那些被诊断为非社会性类型和非道德类型的精神病态人格的患者而制定的。这种病态的特征是说谎、偷盗、性异常、酗酒等，但不包括重大犯罪行为。
9	Mf男子-女子气量表	28	50	此量表也叫男性-女性量表，它原来是为了鉴别男性同性恋而制定的。反映被测试者的男性化或女性化程度。
10	Pa妄想狂量表	25	80	此量表是为了区分那些被判断为具有关系妄想、被害妄想、夸大自我概念、猜疑心、过度地敏感、意见和态度生硬等偏执性人格而制定的。
11	Pt精神衰弱量表	39	65	此量表是为了测定精神衰弱的一般性症候类型而制定的。精神衰弱的特征为：焦虑、强迫动作、强迫观念、无原因的恐怖等。
12	Sc精神分裂症量表	59	78.75	此量表原来是为了区别精神分裂症的患者而制定的。其特征包括：思维、感情和行为混乱。
13	Ma轻躁狂量表	35	78	此量表原来是为了区别有躁狂性症候的精神科患者而制定的。其特征包括：气质昂扬，爱说、精力充沛、易怒、思维奔逸、抑郁气短等。
14	Si社会内向量表	34	46	此量表是为了鉴别对社会性接触和社会责任有退缩回避倾向者。

被测者临床量表人格特征分析

1、疑病 (Hs) 得分 : 40

测试结果：正常

2、抑郁 (D) 得分 : 38 注：本量表分数升高反映有抑郁情绪，缺乏自尊心和感觉不适，是临床病人最常见的高分量表之一。

测试结果：正常

3、癔症 (hy) 得分 : 37

测试结果 : 正常

4、心理变态 (Pd) 得分 : 50 注 : 本量表与反社会行为有关, 难以控制, 家庭关系破裂、冲动、难以遵守学习、工作纪律或法律, 可有酒精中毒或滥用药物等。

测试结果 : 正常

5、女性男性化 (Mf-f) 得分 : 67.5

测试结果 : 正常

6、偏执 (Pa) 得分 : 80 注 : 此量表分数过分升高经常与多疑、孤独、精明、警惕、容易烦恼以及过分敏感有关。

测试结果 : 被测者 (高分) 可能表现为怪罪和怀有怨恨别人的投射防卫机制。一般具有敌意和爱争辩的特点, 而且不太愿意接受心理治疗。

7、精神衰弱 (Pt) 得分 : 65

测试结果 : 正常

8、精神分裂 (Sc) 得分 : 78.75

测试结果 : 被测者 (高分) 表现为异乎寻常或分裂的生活方式, 他们表现为退缩、胆小、缺少内心体验、紧张、混乱及易怒。可出现特异或奇怪的想法, 判断力差及反复无常的情绪。分数很高可表现为与现实接触差, 感觉体验古怪, 有妄想和幻觉。被测者对治疗关系可能有一定的困难, 他们缺乏知识和解决问题的技能。

9、轻躁症 (Ma) 得分 : 78

测试结果 : 被测者 (高分) 表现为善于交际、外露、冲动、精力过于充沛、乐观、不受约束的道德观念、轻浮、暴饮、夸张、易怒、过于乐观及不现实的计划。他们过高估计自己及过于做作, 他们表现急躁易怒, 得分超过80的人, 可能表现有情感障碍、行为古怪、情绪反复无常、行为冲动、还可能有妄想。

10、社会内向 (Si) 得分 : 46

测试结果 : 正常

一般来讲，完成该测验大约需要45-90分钟或者更多时间，对一些病人的测验，则可能要几小时。一般测查是一次完成。但由于MMPI需要回答时间较长。同时又较枯燥。如果一个人焦虑或情绪不稳定。如果一个人比较慌乱而不能理解指导语。那么可以采取由测验者将题目读给被测验者听。

测验结果的解释

如果T分在70以上（按美国常模），或T分在60以上（中国常模），便视为可能有病理性异常表现或某种心理偏离现象。

一般认为临床量表中某一量表T分达到或超过70（美国常模）或60（中国常模）时便有临床意义。如D量表T分>70或以上，便可解释此人有抑郁症状。

但很多实际情况并非如此。实际应用中并不能孤立地分析某量表分的得分，而需综合各量表分高低特征进行分析，分析的方法较多。

常用的分析方法有：

- ① 两点编码法：如1/2，2/1---8/9，9/8等
- ② 多点编码法（有多个高峰时）
- ③ 因子分析法（正 \wedge ，倒 \vee ）
- ④ 判别分析法（建立判别式方程）
- ⑤ 经验法（如以MF为支点，前跷为神经质，后跷为精神病）

MMPI的量表结构

1、效度量表（4个）

L(lie)为说谎分数。

分数高表示答案不真实。

L原始分超10分，不能信任结果。

F(infrequency or fake bad)为诈病分数。

分数高表示诈病或确系严重偏执。

F的原始分超过25分，测验结果有无效的偏离态势，结果不可信；

16~25分可能是诈病，也有可能是利用测验来夸大自己的问题以得到帮助；

10~15分是精神病患者和严重的神经质经常得到的分数；

3~9分，可能在某些方面遇到困难；

0~2分则为正常人。

K(defensiveness)为校正分数。

分数高表示一种自卫防御反应。

得分与被试的教育及社会经济地位有关。

K的量表分大于70分认为被试不合作，结果不可信。

2、临床量表（10个）

- 1、Hs (hypochondriasis)疑病
- 2、D (depression)抑郁
- 3、Hy (hysteria)癔病
- 4、Pd (psychopathic deviate) 病态人格

- 5、Mf (masculinity-femininity)男子气—女子气
- 6、Pa (paranoia) 偏执
- 7、Pt (psychasthenia)精神衰弱
- 8、Sc (schizophrenia)精神分裂症
- 9、Ma (hypomania)轻躁狂
- 10、Si (social introversion)社会内向

MMPI的10个临床量表

①疑病量表(Hypochondriasis, Hs)

由反映躯体健康有关的条目组成。

如：“我每周胸痛好几次（是/否）”。

测量被试的疑病倾向或对健康和身体的关怀程度。

高分表示受试有许多身体上的不适,不愉快,自我中心、敌意、需求、寻求注意等。

②抑郁量表(Depression, D)

由反映情绪低落、焦虑的问题组成。题目如“我通常感到生活有趣和有价值（否）”

高分表示受试情绪抑郁,缺乏自信等。

③癔病量表(Hysteria, Hy)

由反映对心身症状的关注和敏感、自我中心的问题组成。

题目如“我的心脏跳得很厉害,以至常常我都能感觉到（是）”。

高分提示受试倾向于用否认和压抑来处理困难冲突的特点。

④病态人格量表(Psychopathic Deviate, Pd)

由反映变态行为的问题组成。

题目如“我的行为和兴趣常常被别人批评（是）”

反映受试冲动、社会适应差,无视法规和权威,敌意和攻击性等倾向。

⑤男性 - 女性倾向量表(Masculinity femininity, Mf)

测量男性或女性气质差异及同性恋倾向。

题目如“我希望作个女人（是）”。

高分男性表现为敏感、爱美、被动,女性化倾向。低分男性表现为好攻击、粗鲁、受冒险、粗心大意及兴趣狭窄等。

高分女性表现为粗鲁、好攻击、自信、缺乏情感、不敏感等。低分女性多为被动、屈服、诉苦、吹毛求疵、理想主义,敏感等特点。

⑥妄想量表(Paranoia, Pa)

测量异常思维特征,如怀疑甚至妄想。

题目如“有坏人试图影响我的思想”。

高分常与多疑、孤独、敌意、愤怒、指责有关。

⑦精神衰弱量表(Psychasthenia, Pt)

测量强迫、恐怖等神经官能症等特点。

题目如“我保留几乎所有我买的东西,即使我不再用它（是）”。

高分者反映紧张、焦虑、强迫思想和恐怖等特点。

⑧精神分裂症量表(Schizophrenia, Sc)

测量怪异思维和行为等精神分裂症的特点。

题目如“我周围的事物似乎不真实(是)”。

高分反映退缩,情感不稳,思维怪异,幻觉和妄想。

⑨轻躁狂量表(Hypomania, Ma)

反映过分兴奋、夸大等轻躁狂症的特点。题目如“我感到自己的能力超人(是)”。

高分反映外向,夸张,易激惹,精力过分充沛、乐观、无拘束等特点。

⑩社会内向量表(Social Introversion, Si)

测量社会化倾向,低分反映外向。

题目如“我经常一人独处(是)”。

高分反映内向、羞怯、退缩、不善交际、屈服,过分自我控制等。

研究量表:

A(anxiety)焦虑

R(repression)压抑

MAS(manifest anxiety scale)外显性焦虑

Es(ego strength)自我力量

Dy(dependency)依赖性

Do(dominance)支配性

Re(social responsibility)社会责任感

Pr(prejudice)偏见

St(social status)社会地位

Cn(control)控制

后 记

(1)明尼苏达多项人格测验(MMPI)是由美国明尼苏达大学的心理学家哈撒韦Hathaway和精神科医生麦金利Mckinley于1940年编制而成,可以用于测试正常人的性格类型,也可以用于区分正常人和精神疾病患者。

(2)MMPI量表仅供精神科临床使用,本报告不负担任何非正常使用的法律责任。